

Quand la tuberculose est-elle contagieuse ?

Les conseils du Pr Christos Chouaïd, pneumologue, Hôpital Saint-Antoine

Un malade atteint de tuberculose pulmonaire est contagieux si l'on trouve du bacille dans ses crachats. Plus le nombre de bacilles est élevé, plus le malade est contagieux. Dans ce cas, le malade doit porter un masque. Au fur et à mesure du traitement, le nombre de bacilles projetés par le patient diminue, le risque de contagion aussi. Tout patient contagieux doit porter un masque afin d'éviter de contaminer ceux qui l'entourent. Et surtout éviter le contact des personnes fragiles : les enfants de moins de 15 ans, les personnes âgées, les personnes immuno-déprimées et les femmes enceintes. En général, une personne atteinte de tuberculose non-pulmonaire n'est pas contagieuse.

Si j'ai été en contact prolongé avec une personne souffrant de tuberculose :

Je me rends chez mon médecin qui me prescrira une intra-dermo réaction (IDR), une radiographie pulmonaire, suivies d'une surveillance en général 3 et 12 mois plus tard. L'intra-dermo réaction (IDR) est un test de contrôle de la vaccination ou du contact avec le bacille : une protéine du bacille, la tuberculine, est injectée dans la peau d'une personne infectée ou vaccinée.